


VIH/sida dans l'Enquête de Séroprévalence et sur les Indicateurs du Sida au Congo 2009


Au cours de l'ESISC-I, plus de 12 000 femmes et hommes âgés de 15-49 ans ont été testés pour le VIH. D'après les résultats de l'enquête, la prévalence du VIH dans la population générale des femmes et des hommes de 15-49 ans est estimée à 3,2 %.

Prévalence du VIH par sexe et résidence




La prévalence du VIH est environ deux fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes : 4,1 % des femmes sont séropositives, contre 2,1 % des hommes. Globalement, la prévalence est plus élevée en milieu urbain que rural.

Prévalence du VIH par sexe et âge




Quel que soit le sexe, la prévalence augmente avec l'âge. Chez les femmes, d'un minimum de 1,9 % à 15-19 ans, le taux dépasse 5 % dès 25-29 ans et se maintient au-dessus de ce niveau à pratiquement tous les âges jusqu'à 45-49 ans. Chez les hommes, le taux augmente plus lentement que chez les femmes mais à partir de 40 ans, il s'élève rapidement pour atteindre 5,7 % dans le groupe d'âges 40-44 ans.

Prévalence du VIH par département




Dans l'ensemble, c'est dans les départements de la Lékoumou, du Niari et de Pointe-Noire que la prévalence du VIH est la plus élevée. À l'opposé, les départements de la Cuvette-Ouest, du Pool et de la Cuvette se caractérisent par les prévalences les plus faibles.

Prévalence du VIH selon le niveau d'instruction




La prévalence est nettement plus élevée parmi les femmes ayant fréquenté l'école que chez les autres : 3,6 % chez les femmes qui n'ont jamais fréquenté l'école contre 5,3 % chez celles de niveau secondaire 2nd cycle ou supérieur. Chez les hommes, le taux est deux fois plus élevé chez les plus instruits que chez ceux sans instruction.

Prévalence du VIH selon l'état matrimonial




C'est parmi les femmes en rupture d'union, en particulier les veuves (14 %), que le taux de séropositivité est le plus élevé. À l'opposé, c'est parmi les femmes en union que l'on enregistre la prévalence la plus faible (3,3 %). Chez les hommes, les variations selon l'état matrimonial sont beaucoup plus faibles.

Prévalence du VIH selon le nombre de partenaires sexuels sur la durée de vie




Le taux de séropositivité varie de manière importante selon le nombre de partenaires sexuels sur la durée de vie. Plus le nombre de partenaires sexuels est élevé, plus la prévalence du VIH est élevée.

Prévalence du VIH parmi les couples



Dans la grande majorité des couples, les deux conjoints sont séronégatifs et, à l'opposé, dans 1 % des couples, les deux conjoints sont séropositifs. Cinq pour cent des couples sont discordants : dans la majorité des cas, c'est la femme qui est séropositive (3 %).

Test du VIH antérieur à l'enquête parmi les séropositifs



Parmi les femmes et les hommes séropositifs, près des deux tiers n'ont jamais effectué de test. Environ un tiers a déjà effectué un test et a eu connaissance des résultats.

Taux de réponse et méthodologie: Lorsqu'un sujet acceptait de participer au test du VIH, du sang capillaire était prélevé au moyen d'une piqûre faite au doigt. La population éligible pour le test du VIH est constituée des 12 413 personnes (6 550 femmes de 15-49 ans et 5 863 hommes de 15-49 ans) qui ont été interviewés lors de l'ESISC-I. De ce total, 97,6 % ont accepté de donner du sang. Les taux de réponse sont plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain (respectivement, 99 % et 96 %).

Pour tous renseignements concernant l'Enquête de Séroprévalence et sur les Indicateurs du Sida au Congo (ESISC-I), contacter:

Au Congo:

Centre National de la Statistique et des Études Économiques
BP 2031
Brazzaville, Congo
Téléphone/Fax (242) 81 59 09
Email : cnsee@hotmail.fr
www.cnsee.org

Aux Etats-Unis:

MEASURE DHS
ICF Macro
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone: 301-572-0200
Fax: 301-572-0999
www.measuredhs.com

L'ESISC-I a été réalisée au Congo en 2009 par le Centre National de la Statistique et des Études Économiques (CNSEE) en collaboration avec le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) qui s'est chargé de l'analyse des prélèvements sanguins pour l'estimation de la prévalence du VIH. ICF Macro qui a la charge, au niveau international, du programme Demographic and Health Surveys (MEASURE DHS), a fourni son assistance technique pour la réalisation de cette enquête. L'ESISC-I a été financée par le Gouvernement du Congo, l'UNICEF, l'UNFPA et le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Enquête de Séroprévalence et sur les Indicateurs du Sida au Congo (ESISC-I) 2009

Prévalence du VIH

